

緑の相談コーナーだより

NO. 337 2013. 7 . 1 発行

岩見沢市志文町 794 番地

いわみざわ室内公園「色彩館」

身近な樹木 “ノイバラ” (野茨・野薔薇) ～山を愛する人を楽しませる白い花の香る木～



Rosa multiflora THUNB.
ノイバラ

バラ科バラ属の落葉性小形低木で、現代バラの原種のひとつでもあります。日本各地や中国、台湾、朝鮮などに分布し、山野や川岸などに野生し、高さ2 m前後のややつる状となり、枝には刺状の突起があります。初夏になると、純白もしくは淡紅色で、花径2 cmくらいの花が咲きます。夏の訪れを感じさせる緑の美しい季節に、満開のノイバラの花はひととき鮮やかに咲きほこり、山を訪れる人々を魅了します。また、5枚の花弁からは独特の芳香が放たれ、楽しませてくれます。なお、わが国に自生する類似種としては、花茎が大きめで淡紅色のツクシイバラ、若干小形の白い花をつけるヤブイバラ、葉に

光沢のあるテリハノイバラ、富士、箱根に分布するフジイバラ、日本海側の山野に分布するミヤコイバラなどもあります。

植物名の由来ですが、和名の野茨は野外にはえるバラという意味で、薔薇(バラ)を茨(イバラ)というのはトゲがあるからで、イバラは、わが国で元来トゲのある低木の総称でした。因みに漢名は「野薔薇」で、野に生育するツル性の植物が由来のようであり、英名の Rose は = red のことで、赤いという意味から派生した名前ようです。また、別名・異名としてハナイバラやニンドウバラなどの呼び名もあります。

ところで、現在バラの原種数は北半球のみに 120 種ほどあるといわれ、そのうち、現代バラ(モダンローズ)の基になったのは 10 数種で、ノイバラもその1つにあげられています。中国のコウシンバラの四季咲き性、日本のノイバラの多花性、そして日本のテリハノイバラのつる性が欧州のガリカ系やダマスク系と交雑され、現代バラは生まれたといわれています。こうして現在では、バラの品種は3万とも5万ともい

われ、世界では、年間 300 ～ 500 の品種が誕生するようになりました。

ノイバラの用途としては、公園樹や花材、接ぎ木の台木として用いるほか、花を焼酎に漬けて花酒とするほか、果実はローズヒップティーとして愛飲されます。また、「^{ばらすい}薔薇水」といわれる花と蒸留水の混合物は、薬用として口内炎に効用があるとされます。

花いばら故郷の路に似たるかな

蕪 村

茨さくや根岸の里の貸本屋

正岡子規



公園だより



バラ園

5月は低温続きで、園芸作業や田畑の作物の生育も大幅に遅れ、どうなることかと思っていましたが、6月になってからは一転して暖かい日が続き、農業関係者や園芸愛好家の皆さんは一安心したところでしょうか？今月は、バラ園がいよいよリニューアルオープンを迎えます。そうして、第22回バラサミットが、11～12の2日間にわたって、いわみざわバラ園内で開催されます。1昨年から改植が始まった新バラ達が、その枝先に蕾をふくらませ、間もなく一斉に一番花の開花の日を迎えることでしょう。また、ハマナスの丘や園路沿いのハマナスは、先月の下旬頃から香しい花を咲かせております。イングリッシュローズガーデンでは、イングリッシュローズの花に加え、宿根草などの花々も咲いて、独特の空間を楽しんで頂けることと思います。リニューアルした今年のバラ園の姿をぜひご覧下さい。

♥ **今月のバラ園からの一口メモ**は、バラによい環境を整えるポイントです。まず、その第一はどこに植えるかですが、バラが好むのは次のような場所です。①できれば1日に4時間以上の日照があることです。なお、西日よりも午前の日差しを好みます。やや日陰でも育ちますが、花数が少なくなり、軟弱に育つため病虫害の被害を受けやすくなります。クライミング・ローズは根元の方が日陰でも枝が伸びていきますので、伸びた先で十分に日照が確保できれば大丈夫です。②風通しのよいことも大切です。風通しが悪いと、気温が高い季節に蒸れてしまい、病虫害の発生原因になります。できれば、そよ風が吹き抜けるようなところが理想です。③北海道のような寒冷地では、冬期の積雪が多いところの方が、寒干害の被害が少なく有利です。その点岩見沢市は雪折れに対する防御さえすれば、バラの育てやすい場所といえます。

色彩館では、先月の末からタイサンボクの花が咲き始めました。壁面のツルバラは盛りは過ぎましたが、四季咲き性のものが咲いています。

南国温室では、エンゼルス・トランペットが花の時期を迎えております。また、ストレリチア・ニコライが、大きな鳥のくちばしのような花を咲かせました。

相 談 日 記

問 スズメバチ等の害虫防除についてお伺いします。最近家庭果樹（特にブドウ類）を育てていて、スズメバチ等の襲来に悩まされています。果実がほとんど収穫できないだけでなく、人的被害の危険もあり、野菜畑に近づくことも躊躇^{ちゅうちよ}されます。これらの被害を軽減する簡易な捕獲方法があれば知りたいのですが？

答 これから暑い夏期には、スズメバチがさかんに活動し、毎年各地でこの被害が報告されます。蜂毒は、刺されると抗体がだんだんと蓄積されて、危険度合いが増加しますので、過去に刺されたことのある方や高齢者の人はとくに注意が必要です。家庭菜園などでの被害を軽減するには、捕獲器による捕殺が安全で効果的だと思います。そこで、安全で安価なうえ捕獲効果が高い、ペットボトル捕獲器による防除方法を紹介したいと思います。

ペットボトル捕獲器の作り方



樹の枝や軒下などに、できれば頭上より高く吊り下げます。

◎虫入口孔は横幅 16 mm、縦長 17 mm 程度がスズメバチに適しています。

◎口孔の上縁は切らず、外側に斜め下に折り曲げ雨水の流入防止屋根とします。なお、他の3辺は切断します。

◎虫入口孔の数は、対面を含め2個が良い。

誘引液の調合と補充

誘引液は、天然の酵母菌（イースト菌）により樹液が自然発酵し、蜂や蝶、カブト虫、黄金虫、アブ、ハエなどが好んで群がっている甘酸っぱい香りの山野樹液に近づけるよう、次のように作ります。

◎500cc ペットボトル利用の場合は、日本酒（アルコール 13～16度の清酒）一合（180cc）に食酢を 25cc と砂糖を 35 g 加えて攪拌し誘引液を作ります。大用器などでは相応に増量しましょう。◎誘引液減少時は砂糖水だけを補充します。虫に付着した天然酵母菌により、砂糖水はアルコール発酵します。

茎から溢れ出るように咲く花～グラジオラス 花言葉 慎重な愛



グラジオラスは、アヤメ科グラジオラス属の球根性多年草で、南アフリカ原産で耐寒性があり、地中海沿岸からアフリカ南部にかけて約 250 種が自生します。19 世紀初め、欧米で盛んに交配改良が行われ、日本には明治初年に渡来し、現在では切り花や花壇用に多く栽培されています。花は、花穂の 1 方向だけに横向きにつきます。花の色は、紅色、淡紅色、黄色、白色および、これらのしぼりなど、きわめて多く変化に富んでいます。春咲き種と夏咲き種がありますが、夏咲きのものが多いようです。植物名の由来はラテン語の *gladius*（小さな剣）の意味で、葉の形状が剣に似ていることと、葉の間から出る花序の形に由来します。また、別名のオランダアヤメは、西洋から渡来したことを意味し、和名のトウショウブ（唐菖蒲）は、外国産のショウブの葉に似た植物の意味です。繁殖は球根と木子を使います。また、手入れのポイントは、地植の場合に大型種には支柱を立て、倒れないようにする必要があります。

7～8月の園芸講座・行事案内

市民園芸講座の内容紹介

♣ バラ園のバラを使ったアレンジメント

日時 7月 7日（日） 13:00～15:00

講師 フラワーデザイナー 富井加代子 さん 定員 30人 材料代 1000円



♣ バラの美しい写真の写し方

日時 7月 14日（日） 10:00～12:00

講師 ナチュラル写真家 若林 信男 さん 定員 20人 参加料 無料

♣ 盆栽作りの楽しさ

日時 7月 21日（日） 13:00～15:00

講師 岩見沢樹石会 吉川 茂 さん 定員 40人 参加料無料

♣ バラ園で絵手紙を書こう

日時 8月 4日（日） 13:00～15:00

講師 日本絵手紙協会 喜多登代子 さん 定員 20人 材料代 200円

編集・発行 北海道グリーンランド（空知リゾートシティ株式会社）

お問い合わせは 室内公園「色彩館」緑の相談コーナー 25-6111 まで